

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА 21.01.2009

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Aspetin Adipharm 500 mg tablets

Аспетин Адифарм 500 mg таблетки

Ацетилсалицилова киселина (*Acetylsalicylic acid*).

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Аспетин Адифарм и за какво се използва
2. Преди да използвате Аспетин Адифарм
3. Как се прилага Аспетин Адифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Аспетин Адифарм
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Аспетин Адифарм и за какво се използва?

Аспетин Адифарм е предназначен за симптоматично лечение на простудни заболявания с температура и слаби до умерени болки, невралгии, зъбобол, мигрена. Използва се също така и като противовъзпалително средство при ревматоиден полиартрит, неврити и полиневрити.

Аспетин Адифарм е аналгетично, антипиретично и противовъзпалително лекарство (нестероидно противовъзпалително/ аналгетично).

2. Преди да използвате Аспетин Адифарм

Не използвайте Аспетин Адифарм:

- ако имате активни язви на стомаха или дванадесетопръстника;
- ако имате патологично повишена склонност към кръвоизливи;

- ако сте свръхчувствителен (алергичен) към ацетилсалицилова киселина или към някои от помощните вещества;
- ако имате анамнестични данни за реакция на свръхчувствителност (алергична) към салицилати или други нестероидни противовъзпалителни лекарства с астматични пристъпи или подобни пристъпи;
- ако вземате едновременно метотрексат при дози 15 mg или повече седмично;
- по време на първото и последно тримесечие на бременността;
- при деца под 12 годишна възраст.

Обърнете специално внимание при употребата на Аспетин Адифарм:

- ако се лекувате едновременно с антикоагуланти;
- ако имате стомашна язва или язва на дванадесетопръстника, или анамнестични данни за стомашно-чревни кръвоизливи;
- ако имате увредена чернодробна или бъбречна функция;
- ако сте свръхчувствителен към други противовъзпалителни или антиревматични лекарства или други алергени;
- Аспетин Адифарм може да прилага само при деца над 12 годишна възраст;
- Лекарствени продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина трябва да се използват при деца и подрастващи с фебрилни състояния само след внимателна преценка на рисковете и ползите от такова лечение, поради възможност за развитие на синдрома на Reye, рядко, но много сериозно заболяване;
- Ацетилсалициловата киселина може да причини бронхоспазъм и индуцира астматична атака или други реакции на свръхчувствителност. Рискови фактори са съществуваща бронхиална астма, сенна хрема, назални полипи или хронично белодробно заболяване;
- Това се отнася също така и за пациенти с алергични реакции (напр. кожни реакции, сърбеж, уртикария) към други вещества;
- Преди оперативна интервенция (включително малки хирургии, като изваждане на зъб) времето на кръвене може да е удължено. Моля уведомете вашия лекар или фармацевт, че вземате Аспетин Адифарм;
- В ниски дози ацетилсалициловата киселина редуцира екскрецията на пикочната киселина. Това може да провокира подагра при пациенти с тенденция за ниска екскреция на пикочна киселина.

Прием на други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали някакъв друг лекарствен продукт. Не забравяйте също така да споменете и лекарствата, които сте закупили без рецепта.

Ефектите на лекарствата или групи от субстанции, представени по-долу могат да бъдат повлияни от едновременното лечение с Аспетин Адифарм.

Засилени ефекти, изразяващи се в повишен риск от нежелани реакции:

- Антикоагуланти, напр. кумарин, хепарин: ацетилсалициловата киселина може да повиши риска от кървене, ако се взема преди тромболитичното лечение. Следователно вие трябва да обърнете внимание на симптомите за вътрешни или външни кръвоизливи (напр. след травми), ако сте подложен на такова лечение;
- лекарства, съдържащи кортизон или кортизонови субстанции (с изключение на продуктите, които се прилагат локално или кортизон, използван за заместващо лечение при Адисонова болест) или алкохолна консумация: повишен риск от стомашно-чревни язви или кръвоизливи;
- лекарства, понижаващи кръвната захар;
- метотрексат (лекарство за лечение на рак и някои заболявания на ставите, като ревматоиден артрит);
- дигоксин (лекарство, което засилва контракцията на сърдечния мускул);
- други нестероидни противовъзпалителни лекарства/ аналгетици и Аспетин Адифарм в дози от 3 г ацетилсалицилова киселина;
- валпроева киселина (лекарство за лечение на гърчове).

Аспетин Адифарм отслабва действието на:

- диуретици (лекарства, които повишават екскрецията на урината);
- АСЕ инхибитори (група от лекарства, които понижават кръвното налягане);
- лекарства за подагра, които засилват екскрецията на пикочната киселина (пробенецид, бензбромарон).

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на който и да е лекарствен продукт.

Аспетин Адифарм не трябва да се приема през първия и последен триместър на бременността. Консултирайте се с вашия лекар, преди да вземете Аспетин Адифарм през вторите 3 месеца на бременността.

Обикновено не е необходимо да се прекъсне кърменето при краткотрайно използване на препоръчаните дози.

Шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно от съставките на Аспетин Адифарм:

Поради наличието в състава на Аспетин Адифарм на пшенично нишесте, да не се прилага при пациенти с глутенова ентеропатия (вродено заболяване на тънките черва, проявяващо се с диария при употреба на пшенични продукти).

3. Как да приемате Аспетин Адифарм

Винаги използвайте Аспетин Адифарм точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките се приемат перорално след хранене, с чаша вода. Ако Аспетин Адифарм дразни стомаха Ви, приемайте го по време на хранене. Аспетин Адифарм се приема през равни интервали от 4-8 часа.

Възрастни: 500 -1000 мг (1-2 таблетки) като еднократна доза, повтаря се на интервали от 4-8 часа, но не повече от 4 грама дневно.

Деца над 12 години: Препоръчва се 500 мг (1 таблетка) като еднократна доза не повече от 3-4 пъти дневно. Като антипиретик до 3 дни, като аналгетик до 5 дни, без лекарско предписание.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарствени продукти, Аспетин Адифарм може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Стомашно-чревни нарушения:

Коремна болка, киселини, гадене, повръщане.

Стомашно-чревни кръвоизливи, които в много редки случаи могат да причинят желязо-дефицитна анемия.

Стомашно-чревни улцерации (язви) и перфорация.

Описани са изолирани случаи на нарушена функция на черния дроб.

Нарушения на нервната система:

Световъртеж и шум в ушите, които обикновено са характерни при предозиране.

Хематологични нарушения:

Ацетилсалициловата киселина може да се свърже с повишен риск от кръвоизливи, дължащи се на ефекта върху тромбоцитната агрегация.

Реакции на свръхчувствителност:

Уртикария, кожни реакции, анафилактически реакции, астма, оток на Квинке.

Ако забележите трудност в дишането или кашлица, шум в ушите, обрив, черни изпражнения, обърканост, замаяност, стомашна болка – спрете веднага да приемате Аспетин Адифарм и съобщете на Вашия лекар за състоянието си.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на Аспетин Адифарм

Съхранявайте при температура под 25° С.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичане на срока на годност, обозначен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Аспетин Адифарм

- Активната съставка е ацетилсалицилова киселина. Всяка таблетка съдържа 500 mg ацетилсалицилова киселина (*acetylsalicylic acid*).

- Другите съставки са микрокристална целулоза, пшенично нишесте, натриев нишестен гликолат, силициев диоксид, колоиден безводен и талк.

Как изглежда Аспетин Адифарм и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели или почти бели, кръгли и плоски, с делителна черта.

Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 10 таблетки.

Една опаковка съдържа 20 таблетки (2 блистера) и/ или 100 таблетки (10 блистера).

Притежател на разрешението за употреба и производител

Адифарм ЕАД

бул. "Симеоновско шосе" № 130

1700 София, България

Дата на последна актуализация на текста

Ноември, 2008 г.