

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**TROMBOGARD 100 mg tablets / ТРОМБОГАРД 100 мг таблетки**  
*Ацетилсалицилова киселина (Acetylsalicylic acid)*

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Тромбогард и за какво се използва
2. Преди да използвате Тромбогард
3. Как се прилага Тромбогард
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Тромбогард
6. Допълнителна информация


**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРОМБОГАРД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Тромбогард 100 mg принадлежи към групата на лекарствени продукти, които потискат агрегацията на вид кръвни клетки (тромбоцитите) и предотвратяват образуването на тромби. Тромбогард 100 mg притежава кардиопротективен ефект.

Използва се при:

- лечение на нестабилна ангина пекторис;
- остър инфаркт на миокарда - като част от стандартната терапия;
- вторична профилактика след инфаркт на миокарда;
- след артериални съдови операции или интервенции (след аортокоронарен байпас, при перкутанна транс-луминална коронарна ангиопластика);
- за профилактика на преходни исхемични атаки и мозъчни инфаркти, когато се наблюдават предупредителни симптоми.

Тромбогард 100 mg не е подходящ за лечение на болкови състояния.



## **2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРОМБОГАРД**

Тромбогард 100 mg не трябва да се използва при:

- известна свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина или към някое от помощните вещества, съдържащи се в таблетките Тромбогард;
- патологично повишена склонност към кървене;
- лошо храносмилане, пептична язва на стомаха и/или дванадесетопръстника;

Този продукт не трябва да се използва през първи и трети триместър от бременността, тъй като е възможно да причини сериозна вреда на плода, може да доведе до забавяне или удължаване на раждането и удължаване на кървенето.

През втори триместър на бременността лекарственият продукт не трябва да се използва, освен ако това не е абсолютно неизбежно. При наличието на сериозни причини за прилагане на продукта при жени, които очакват да забременеят или са във втори триместър на бременността, дозата трябва да бъде възможно най-ниската и лечението да продължи възможно най-кратко време.

### **Обърнете специално внимание при употребата на Тромбогард**

Преди да приемете Тромбогард, непременно се консултирайте с лекар, ако страдате от някое от по-долу посочените заболявания. При тези групи пациенти трябва да се прилага с особено внимание: астма и полипи в носа; заболявания на кръвотворната система; заболявания на черния дроб или бъбреците; неконтролирана хипертония; диабет; пациенти приемащи концентриран алкохол всеки ден в количество над 75 мл.

Тромбогард 100 mg не бива да се приема от деца под 18 год. и подрастващи, при болни от варицела и други вирусни заболявания, поради опасност от синдрома на Рей. Тромбогард 100 mg може да се дава на деца под 18 год. само по изрично предписание на лекар и при липса на други ефикасни средства.


### **Прием на други лекарства**

*Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.*

Тромбогард може да взаимодейства с алкохол, противовъзпалителни средства, антикоагуланти, хормони, антидиабетични средства, антиепилептични средства, пробенецид, гинко билоба.

### **Бременност и кърмене**

*Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.* Не се препоръчва приемането на Тромбогард по време на бременност, освен ако не е изрично предписан от лекар.



## **Шофиране и работа с машини**

Не са необходими специални мерки.

### **3. КАК СЕ ПРИЛАГА ТРОМБОГАРД**

*Ако лекарят не е предписал друго, спазвайте следните правила за употреба на Тромбогард 100 mg. Придържайте се към инструкциите, защото в противен случай е възможно Тромбогард 100 mg да не покаже задоволителен ефект!*

Таблетките трябва да се приемат веднъж дневно, по възможност винаги по едно и също време на деня, след хранене с достатъчно количество течност. Избягвайте употребата им на празен стомах.

В случай на остър инфаркт на миокарда първата таблетка трябва да се сдъвче преди да се преглътне.

Тромбогард 100 mg е предназначен за продължителна употреба. Продължителността на лечението ще бъде определена от Вашия лекар.

След аортокоронарен байпас терапията с Тромбогард 100 mg започва 24 часа след операцията. *При лечение на нестабилна ангина пекторис* (болки в гърдите, предизвикани от нарушение на кръвния поток през коронарните артерии на сърцето):

Дневната доза е между 75 и 300 mg ацетилсалицилова киселина. На базата на по-добра поносимост, препоръчаната дневна доза е 1 таблетка Тромбогард 100 mg (еквивалентна на 100 mg ацетилсалицилова киселина).

*При остър инфаркт на миокарда:*

Дневната дозировка е от 100 до 160 mg ацетилсалицилова киселина. Препоръчаната дневна доза е от 1 до 1 ½ таблетки Тромбогард 100 mg (еквивалентни на 100 – 150 mg ацетилсалицилова киселина).


*За профилактика на инфаркт на миокарда след прекаран такъв* (вторична профилактика на инфаркт на миокарда):

Препоръчаната дневна доза е 3 таблетки Тромбогард 100 mg (еквивалентни на 300 mg ацетилсалицилова киселина).

*След хирургически или други интервенции, извършени върху артериите* (след артериални съдови операции или интервенции, напр. аортокоронарен байпас, перкутанна транс-луминална коронарна ангиопластика):

Дневната доза е в интервала между 100 и 300 mg ацетилсалицилова киселина. Ако толерансът е по-добър, препоръчаната дневна доза е 1 таблетка Тромбогард.

*Профилактика на развитието на преходни състояния на недостатъчно оросяване на мозъка* (преходни исхемични атаки) и мозъчен инфаркт, при наличие на предупредителни признаци:



Започва се с еднократна доза от 100 – 200 mg и след това се продължава с прилагането на 50 – 100 mg дневно.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза Тромбогард**

Потърсете незабавно медицинска помощ, ако имате съмнение за предозиране с таблетки Тромбогард 100 mg. Лекарят ще определи какви мерки трябва да се предприемат в зависимост от тежестта на предозирането (интоксикацията). При предозиране може да настъпи замаяност и шум в ушите особено при деца и пациенти в напреднала възраст.

*При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!*

**Ако сте пропуснали приема на Тромбогард**

Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

**Ако сте спрели приема на Тромбогард**

Моля, не прекъсвайте употребата на Тромбогард 100 mg без предварителна консултация с Вашия лекар.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както и всеки друг лекарствен продукт, Тромбогард може да предизвика нежелани лекарствени реакции.*

Често нежеланите лекарствени реакции включват проблеми със стомаха и червата (напр. стомашна болка) и незначителна загуба на кръв в областта на стомаха и червата (слабо кървене).

Понякога са наблюдавани гадене, повръщане и диария.

Рядко са докладвани кървене и образуване на язви на стомаха както и реакции на свръхчувствителност, главно при астматични пациенти (напр. пристъпи на апнея, кожни реакции).


Рядко са наблюдавани нарушения на чернодробната и бъбречните функции, понижаване на кръвната захар (хипогликемия), както и особено тежки кожни реакции.

Ацетилсалициловата киселина в ниски дози потиска отделянето на пикочна киселина. Това може да предизвика пристъп на подагра при предразположени пациенти.

В редки случаи, след продължителна употреба на Тромбогард, е възможно развитието на анемия, поради скрита загуба на кръв от стомаха и червата.

В случай на черни (смолисти) изпражнения (които могат да са признак на кървене в стомаха) е необходимо да информирате Вашия лекар незабавно.

Виене на свят и шум в ушите могат да бъдат симптоми на тежка интоксикация, особено при деца и пациенти в напреднала възраст.



Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТРОМБОГАРД**

При температура под 25°C.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Тромбогард след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ТРОМБОГАРД**

Активното вещество е ацетилсалицилова киселина. Всяка таблетка съдържа 100 mg ацетилсалицилова киселина (*(acetylsalicylic acid)*).

Другите съставки са: лактоза, микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид, натриев стеарил фумарат и кроскармелоза натрий.

### **Как изглежда Тромбогард и какво съдържа опаковката**

Таблетките са бели или почти бели, кръгли и плоски.

Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 20 таблетки.

Една опаковка съдържа 20 таблетки (1 блистер) и/ или 100 таблетки (5 блистера).

### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

АДИФАРМ ЕАД

бул. Симеоновско шосе № 130

София 1700, България

### **Дата на последна актуализация на текста**

Октомври, 2008

