

ИМАЛ
ОДОБРЕНО!
R 9486 / 10.01.09

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.....

Парацетамол Адифарм 500 mg таблетки
Paracetamol Adipharm 500 mg tablets
Парацетамол (*paracetamol*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Парацетамол Адифарм и за какво се използва
2. Преди да приемате Парацетамол Адифарм
3. Как да приемате Парацетамол Адифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Парацетамол Адифарм
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Парацетамол Адифарм е неопиатен болкоуспокояващ и температуропонижаващ лекарствен продукт. Той има по-силно въздействие върху централната нервна система и по-слабо върху периферната, с което се обяснява по-слабото противовъзпалително действие в сравнение с нестероидните противовъзпалителни средства.

Парацетамол Адифарм има следните приложения:

Симптоматично повлияване на слаба до умерена болка - главоболие, зъбобол, слаба до умерена постоперативна или посттравматична болка, при повишена телесна температура вследствие на грип или простуда.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Не приемайте Парацетамол Адифарм:

- Свръхчувствителност към парацетамол и/или към някое от помощните вещества на продукта;
- Тежки чернодробни заболявания

Обърнете специално внимание при употребата на Парацетамол Адифарм

Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако симптомите Ви продължават повече от 5 дни или тези симптоми се придружават от повишена температура, главоболие, обрив, гадене и повръщане повече от 3 дни.

- Ако Ви предстои оперативна интервенция, дори и при зъболекар, трябва да съобщите на лекаря, че приемате парацетамол.
- Ако знаете, че страдате от непоносимост към някои видове захари (например, лактоза, галактоза и др.), трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да започне приема на този лекарствен продукт.
- Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол (комбинирани лекарствени продукти за лечение на простуда) едновременно с Парацетамол Адифарм, за да избегнете риска от предозиране.
- При приемане на антиконвулсанти, изониазид (по лекарско или отпускани без лекарско предписание) заедно с Парацетамол Адифарм трябва да се консултирате с Вашия лекар.
- При пациенти, приемащи повече от 90 ml концентриран алкохол на ден, парацетамол трябва да се прилага внимателно, защото съществува повишен риск от чернодробни увреждания.
- Прилагането при пациенти с бъбречни и чернодробни заболявания трябва да става внимателно при проследяване на чернодробната и бъбречната функция.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременната употреба на парацетамол може да засили ефектите на лекарства, потискащи кръвосъсирването (антикоагуланти и фибринолитици), но клиничната значимост на това взаимодействие е неизвестна.

Холестирамин, антиацидните лекарства и наличието на храна в стомаха намаляват резорбцията на парацетамол. Метоклопрамид и домперидон увеличават степента на резорбция на парацетамол и засилват ефектите му.

Едновременното приемане на парацетамол и някои лекарства като фенитоин, карбамазепин фенобарбитал и изониазид могат да увеличат риска от хепатотоксични ефекти при употреба на парацетамол.

Парацетамол Адифарм не бива да се приема заедно с алкохол, тъй като може да се повиши хепатотоксичността на парацетамол.

Прием на Парацетамол Адифарм с храни и напитки:

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни.

Не бива да се приема заедно с алкохол, поради риск от увеличаване на токсичното действие на парацетамол върху черния дроб.

Бременност и кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

По време на бременност и кърмене Парацетамол Адифарм може да се приема след съвет с лекар.

Шофиране и работа с машини

Парацетамол Адифарм не предизвиква отпуснатост и замаяност и може да се използва от шофьори и работещи с машини.

Важна информация за някои от съставките на Парацетамол Адифарм

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Възрастни и деца над 12 години:

По 1-2 таблетки през 4–6 часа, но не повече от 6 таблетки на ден.

Деца от 6 до 12 години:

По ½-1 таблетка през 4–6 часа, но не повече от 4 таблетки на ден.

Продължителността на лечебния курс без проведена консултация с лекар не трябва да надхвърля 5 дни за възрастни и 3 дни при деца.

Ако сте приели по-голяма доза Парацетамол Адифарм от предписаната

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!

При предозиране е възможно да настъпи увреждане на черния дроб, вкл. тежка чернодробна недостатъчност. При всеки случай на случайно или умишлено предозиране, потърсете незабавно лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приложите Парацетамол Адифарм

Ако сте пропуснали един прием, вземете лекарството във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

Ако сте спрели приема на Парацетамол Адифарм

Моля, не прекъсвайте употребата на Парацетамол Адифарм без предварителна консултация с Вашия лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Парацетамол Адифарм може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Често могат да се наблюдават следните нежелани лекарствени реакции: повишена чувствителност на кожата към слънцето, гадене и повръщане, нарушение на съня и кошмари,

учестен пулс, нервност и раздразнителност, лесна уморяемост, възбуда при децата. В тези случаи може да се продължи приема на парацетамол или да се премине към други подобни препарати.

Рядко се наблюдават смущения в кръвотворенето, вкл. с риск от кръвоизливи.

Рядко се наблюдават алергични реакции (затруднено дишане, стягане в гърлото, подуване на устните, езика, лицето).

Увреждане на черния дроб (пожълтяване на кожата и очите, гадене, стомашна болка, лесна уморяемост или дискомфорт) – наблюдават се при токсични дози.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Парацетамол Адифарм

Активната съставка е парацетамол. Всяка таблетка съдържа парацетамол (*paracetamol*) 500 mg

Другите съставки са кармелоза натрий, лактоза монохидрат, коповидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, талк.

Как изглежда Парацетамол Адифарм и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели, кръгли и плоски с делителна черта.

Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Парацетамол Адифарм 500 mg таблетки се предлага в опаковки по 10 и 20 таблетки.

По 1 или 2 блистера с по 10 таблетки в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

АДИФАРМ ЕАД

бул. Симеоновско шосе № 130

София 1700, България

Дата на последна актуализация на текста

Ноември, 2008