

Листовка: информация за пациента

Фервефлу Антитусив Джуниър 250 mg/100 mg/5 mg/10 ml сироп
Парацетамол/ Гвайфенезин / Фенилефрин хидрохлорид

Ferveflu Antitussive Junior 250 mg/100 mg/5 mg/10 ml syrup
Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 2018-0356	
Разрешение № BG/МА/МБ-44026	
19-12-2018	

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Фервефлу Антитусив Джуниър сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп
3. Как да използвате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фервефлу Антитусив Джуниър сироп и за какво се използва

Фервефлу Антитусив Джуниър сироп е лекарство, съдържащо парацетамол, гвайфенезин и фенилефрин хидрохлорид и има аромат на малина.

Парацетамол овладява болката и понижава температурата. Гвайфенезин улеснява отхрачването, а фенилефрин хидрохлорид води до намаляване на секрецията от носа, отбъবане на лигавицата, облекчаване на затрудненото дишането.

Фервефлу Антитусив Джуниър сироп се използва за краткосрочно лечение на главоболие, болки в гърлото, повишена температура, хрема, кихане, отпадналост, мускулни болки и продуктивна кашлица при простуда и грип. Това лекарство може да се прилага при деца на възраст над 6 години.

Ако след 3 дни Вашето дете не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фервефлу Антитусив Джуниър сироп

Не използвайте за Вашето дете Фервефлу Антитусив Джуниър сироп, ако:

- то е алергично към парацетамол, гвайфенезин, фенилефрин хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б);
- страда от заболявания на черния дроб, бъбреците или сърцето или има високо кръвно налягане;
- има повишена функция на щитовидната жлеза или захарен диабет;
- има тумор, наречен феохромоцитом;
- страда от глаукома (повишено вътречно налягане);
- уринира трудно;
- в момента се лекува или накърно е приемало някои лекарства като МАО-инхибитори, трициклични антидепресанти, бета-блокери, симпатомиметици, включително прилагани като очни или носни капки, инхалатори;
- в момента приема други лекарства, съдържащи парацетамол.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп.

Необходимо е да знаете следното:

- Не прилагайте доза, по-висока от препоръчаната. Възможно е предозиране, необходимо е да се прилага възможно най-ниската доза, която има ефект;
- В случай, че прилагате и други лекарства, проверявайте дали те също не съдържат парацетамол, защото е възможно предозиране;
- При приемане на големи дози за продължителен период от време или при едновременно или редовно приемане на лекарства, увреждащи черния дроб, рисъкът от чернодробно увреждане се повишава;
- Ако Вашето дете има заболяване на сърцето, високи стойности на кръвното налягане, тежки заболявания на стомаха и червата, някои белодробни заболявания и особено астма, то трябва да приема това лекарството само след консултация с лекар;
- Прилагането на парацетамол може да повлияе резултатите при някои лабораторни тестове за определяне на пикочна киселина, а също и теста за определяне на глюкоза в кръвта. Уведомете лекаря, ако на Вашето дете предстоят някои лабораторни изследвания;
- Не трябва да прилагате това лекарство при деца под 6 години или с тегло под 20 kg, освен ако изрично не е назначено от лекар.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако:

- Проявите на болестта продължават по-дълго от 5 дни, а високата температура по-дълго от 3 дни. Той ще прецени дали се налага промяна в дозировката или е необходимо да се назначи друго лечение;
- Ако Вашето дете приема някое от следните лекарства или други неизброени в точка:
 - такива, съдържащи парацетамол
 - предназначени за настинка, съдържащи деконгестант;



- лекарства за разреждане на кръвта, например варфарин;
- лекарства за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни болести, като бета-блокери или дигоксин;
- средства за стимулиране или потискане на апетита;
- лекарства за лечение на депресия;
- Има високо кръвно налягане, заболявания на сърцето, щитовидната жлеза или захарен диабет, повищено вътречно налягане, болест на Рейно;
- Детето е недохранено или с тегло под нормата, тъй като може да е необходима корекция на дозата;
- Инфекцията е продължителна. В тези случаи има риск от възникване на метаболитна ацидоза, чиито прояви са дълбоко, учестено, затруднено дишане, позиви за повръщане, повръщане, загуба на апетит.

Други лекарства и Фервефлу Антитусив Джуниър сироп

Информирайте Вашия лекаря или фармацевт, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало или е възможно да приеме други лекарства.

Не трябва да прилагате това лекарство едновременно с:

- други лекарства, съдържащи парациетамол и/или фенилефрин хидрохлорид или друг деконгестант;
- лекарства за лечение на депресия (трициклични антидепресанти, напр. амитриптилин) или инхибитори на моноаминооксизата. Възможно е да настъпи опасно повишение на кръвното налягане;

Необходимо е да знаете, че ако прилагате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп едновременно с:

- лекарства за разреждане на кръвта, вкл. варфарин, е възможно кръвотечение, тъй като парациетамол усилива тяхното действие;
- таблетки за предпазване от забременяване, те могат да отслабят ефектите на парациетамол;
- лекарства, съдържащи метоклопрамид, домперидон или холестирамин е необходимо интервалът между отделните приеми да бъде поне 1 час;
- бета-блокери, дигоксин и други лекарства за лечение на сърдечни заболявания се повишава риска от нежелани реакции от страна на сърцето.
- обезболяващи и температуропонижаващи лекарства, вкл. аспирин се повишава рисъкът от увреждане на бъбреците;
- симпатомиметици (често срещани в капките за очи или нос) се повишава рисъкът от нежелани реакции от страна на сърцето.

Фервефлу Антитусив Джуниър сироп с храни, напитки и алкохол

Няма ограничения.

Едновременно приложение с алкохол повишира риска от чернодробно увреждане, затова не трябва да се консумира алкохол по време на приема на това лекарство.

Бременност, кърмене и фертилитет



Този лекарствен продукт е предназначен за деца. Не трябва да се приема от бременни и кърмещи жени поради липса на данни за безопасното му приложение.

Шофиране и работа с машини

Неприложимо. Това лекарство е предназначено за деца.

Фервефлу Антигусив Джуниър сироп съдържа сорбитол и пропиленгликол

Фервефлу Антигусив Джуниър сироп съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие или Вашето дете имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с Вашия лекар преди Вие или Вашето дете да приемете това лекарство.

Фервефлу Антигусив Джуниър сироп съдържа пропиленгликол, който може да причини симптоми на алкохолно опиянение.

3. Как да приемате Фервефлу Антигусив Джуниър сироп

Винаги прилагайте Фервефлу Антигусив Джуниър, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Деца на възраст 6 - 12 години

Препоръчителната доза е 10 ml (2 мерителни лъжички от 5 ml). При необходимост тя може да бъде приемана през интервал от 6 - 8 часа.

Не трябва да давате това лекарство през интервал по-малък от 6 часа, а дневната доза не бива да бъде по-голяма от 4 дози (40 ml).

Деца на възраст над 12 години

3-4 пъти дневно по 2 дози сироп (20 ml) през интервал от 6-8 часа.

Приемът на повече от 8 дози (80 ml) дневно не трябва да бъде превишаван, а интервалът между отделните приеми не трябва да бъде по-малък от 6 часа.

Деца на възраст < 6 години

Продуктът не е подходящ за приложение при деца < 6 години или с тегло под 20 kg, освен ако изрично не е назначен от лекар.

Начин на приложение

Това лекарство се прилага през устата.

Мерителната лъжичка се напълва със сироп до мярката. След всяка употреба лъжичката се измива и подсушава.

Обърнете внимание на следното:

- Това лекарство не трябва да се приема през интервал по-малък от 6 часа;
- Дневната доза не бива да бъде по-голяма от посочената по-горе;
- Винаги използвайте най-ниската доза, която оказва ефект;
- Това лекарство не трябва да се приема по-дълго от 3 дни, ако не е назначено от лекар;
- Задължително е да се обрънете към лекар в случай, че след 3 дневно лечение състоянието на Вашето дете не се подобри или оплакванията се появят отново.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фервефлу Антигусив Джуниър сироп



Наблюдавани са отравяния с парацетамол при възрастни и особено при деца, които понякога могат да бъдат много сериозни. Те могат да се дължат на предозиране в резултат на приемане на по-висока от посочената доза или на инциденти по невнимание.

Предозирането се проявява с гадене, повръщане, бледност, коремни болки, изпотяване и сънливост, явяващи се най-често в първите 24 часа. При предозиране с парацетамол може да настъпи тежко чернодробно увреждане и загуба на съзнание. Приемането на високи дози фенилефрин може да доведе до значимо учестване на сърдечната дейност и повишаване на кръвното налягане.

Ако сте приложили повече от препоръчителната доза или при поява на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар или посетете най-близкото медицинско заведение. Носете със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приложите Фервефлу Антитусив Джуниър сироп

Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това веднага щом се сетите. Не прилагайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако това се случи, уведомете Вашия лекар. При лечение с това лекарство е възможна появата на:

- Намаляване броя на кръвните плочки /тромбоцити/, което повишава риска от кървене и образуване на синини и на белите кръвни клетки /левкоцити/, което повишава риска от инфекции;
- Нарушения във функцията на черния дроб;
- Гадене, повръщане, диария, стомашно-чревно неразположение.
- Обриви, уртикария /т.нар. копривна треска/;
- Безсъние, нервност, беспокойство, възбуда, замаяност, главоболие;
- Разширяване на зениците, повишение на вътречното налягане, влошаване на глаукома

Ако се появят някои от следните симптоми веднага прекратете приема на лекарството и се свържете с Вашия лекар:

- Тежка алергична реакция, която причинява оток в областта на очите, устните и гърлото, затруднено дишане или хриптене, тежко заболяване, съпровождано с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи;
- Участване на сърдечната дейност, повишаване на кръвното налягане, което в някои случаи може да бъде значимо;
- Затруднения в уринирането и задръжка на урина;
- Жълтеница – пожълтяване на кожата и на бялата част на очите.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8
1303 София
Тел.: +35 928903417
Уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Фервефлу Антитусив Джуниър сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца при температура под 25 °C

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фервефлу Антитусив Джуниър сироп

- Активните вещества в 10 ml сироп са: парацетамол 250 mg, гвайфенезин 100 mg и фенилефринов хидрохлорид 5 mg.
- Другите съставки са: сорбитол, глицерол, пропиленгликол, лимонена киселина, натриев цитрат, натриев цикламат, захарин натрий, натриев бензоат, аромат на малина, натурален (смес на натурални ароматни вещества и глюкоза), повидон K-30, пречистена вода.

Как изглежда Фервефлу Антитусив Джуниър сироп и какво съдържа опаковката

Фервефлу Антитусив Джуниър сироп представлява бистър, безцветен, вискозен разтвор с аромат на малина.

Фервефлу Антитусив Джуниър сироп се предлага в тъмни стъклени бутилки (тип III), съдържащи 150 ml сироп.

Една бутилка в опаковка с мерителна лъжичка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

«Адифарм» ЕАД

Бул. «Симеоновско шосе» 130

1700 София

България



Дата на последно преразглеждане на листовката – 08/2018

