

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

205042

BG/МК/МР - 46887

31 -07- 2019

Парацетамол Адифарм 500 mg таблетки

Paracetamol Adipharm 500 mg tablets

Парацетамол (*paracetamol*)*Прочетете внимателно листовката преди да започнете да приемате това лекарство.**Това лекарство се отпуска без рецепт. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.**Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.**Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия фармацевт.**Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.***В тази листовка:**

1. Какво представлява Парацетамол Адифарм и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Парацетамол Адифарм
3. Как да приемате Парацетамол Адифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Парацетамол Адифарм
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Парацетамол Адифарм е неопиатен болкоуспокояващ и температуронижаващ лекарствен продукт. Той има по-силно въздействие върху централната нервна система и по-слабо върху периферната, с което се обяснява по-слабото противовъзпалително действие в сравнение с нестероидните противовъзпалителни средства.

Таблетките Парацетамол Адифарм са показани за облекчаване на леки до умерено силни болки при главоболие, зъббол, невралгия, мускулни и ревматични болки, постоперативни или посттравматични болки.

При простуда и грип таблетките Парацетамол Адифарм облекчават мускулните и ставни болки и понижават повишената телесна температура при бактериални и вирусни инфекции.



2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Не приемайте Парацетамол Адифарм:

- ако сте свръхчувствителни към парацетамол и/или към някое от помощните вещества на продукта;
- ако имате тежко чернодробно или бъбречно заболяване;
- едновременно с други лекарствени продукти съдържащи парацетамол, за да избегнете риска от предозиране;
- едновременно с лекарствени продукти за лечение на туберкулоза (рифампицин);
- едновременно с лекарства за лечение на бактериални инфекции (хлорамфеникол);
- едновременно с лекарства за лечение на епилептични припадъци (барбитурати, антиепилептици).

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при деца под 6 годишна възраст.

Обърнете специално внимание при употребата на Парацетамол Адифарм

- ако независимо от лечението, симптомите Ви продължават повече от 5 дни или тези симптоми се придрожават от повищена температура, главоболие, обрив, гадене и повръщане повече от 3 дни, прекратете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.
- ако Ви предстои оперативна интервенция, дори и при зъболекар, трябва да съобщите на лекаря, че приемате парацетамол.
- прилагането при пациенти с бъбречни и чернодробни заболявания трябва да става внимателно при проследяване на чернодробната и бъбречната функция.
- лекарственият продукт трябва да се използва с повищено внимание от слаби и изтощени хора и от злоупотребяващи с алкохол.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Едновременната употреба на Парацетамол с други лекарствени продукти може да засили или отслаби ефектите им:

- Парацетамол може да усили ефекта на лекарства, потискащи кръвосъсирването (антикоагуланти и фибринолитици).
- Холестирамин, антиацидните лекарства и наличието на храна в стомаха намаляват резорбцията на парацетамол.
- Метоклопрамид и домперидон увеличават степента на резорбция на парацетамол и засилват ефектите му.
- Едновременното приемане на парацетамол и някои лекарства като фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал могат да увеличат вероятността от хепатотоксични ефекти.
- Едновременното приемане на парацетамол с противотуберкулозни лекарства (изониазид и др.) може да предизвика тежко чернодробно увреждане.



Прием на Парацетамол Адифарм с храни и напитки:

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни.

Не бива да се приема заедно с алкохол, поради риск от увеличаване на токсичното действие на парацетамол върху черния дроб.

Бременност и кърмене

Моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако е необходимо, Парацетамол Адифарм може да се прилага по време на бременност. Трябва да използвате най-ниската възможна доза, която намалява болката и/или сваля температурата и за възможно най-кратко време. Свържете се с Вашия лекар, ако болката и/или температурата не са намалели или ако трябва да приемате лекарството по-често.

Шофиране и работа с машини

Парацетамол Адифарм не предизвиква отпуснатост и замаяност и може да се използва от шофьори и работещи с машини.

Важна информация за някои от съставките на Парацетамол Адифарм

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Винаги приемайте Парацетамол Адифарм точно така, както Ви е посъветвал Вашият лекар. Таблетките се приемат през устата с вода.

Възрастни и деца над 12 години:

По 1-2 таблетки през 4–6 часа, но не повече от 6 таблетки на ден.

Деца от 6 до 12 години:

По ½-1 таблетка през 4–6 часа, но не повече от 4 таблетки за 24 часа.

Продължителността на лечебния курс без проведена консултация с лекар не трябва да надхвърля 5 дни за възрастни и 3 дни при деца.

Ако сте приели по-голяма доза Парацетамол Адифарм от предписаната

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар.

При предозиране е възможно да настъпи увреждане на черния дроб, вкл. тежка чернодробна недостатъчност. При всеки случай на случаен или умишлено предозиране, потърсете незабавно лекарска помощ.



Ако сте пропуснали да вземете Парацетамол Адифарм

Ако сте пропуснали един прием, вземете лекарството във времето на следващия регулярен прием, без да увеличавате дозата.

Ако сте спрели приема на Парацетамол Адифарм

Моля, не прекъсвайте употребата на Парацетамол Адифарм без предварителна консултация с Вашия лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, парацетамол може да предизвика нежелани реакции. Когато парацетамол се приема в препоръчителните дози нежеланите реакции са редки. Могат да се появят гадене и реакции на свръхчувствителност, най-вече кожни обриви, сърбеж и уртикария.

Ако забележите каквото и да било нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАРАЦЕТАМОЛ АДИФАРМ

Да се съхранява под 25 °C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Парацетамол Адифарм

- Активната съставка е парацетамол. Всяка таблетка съдържа 500 mg парацетамол (*paracetamol*).
- Другите съставки са: натриев нишестен гликолат (тип A), лактозаmonoхидрат, коповидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат и талк.

Как изглежда Парацетамол Адифарм и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели или почти бели, кръгли, плоски, с делителна черта от едната страна.

Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.



Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 10 таблетки. Една опаковка съдържа 1 или 2 блистера (10 или 20 таблетки).

Притежател на разрешението за употреба и производител

АДИФАРМ ЕАД

бул. Симеоновско шосе № 130

София 1700, България

Дата на последна актуализация на текста

Юни, 2019

